



**SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION DES  
ANTIBIOTIQUES ATB-RAISIN**  
SYNTHESE DES DONNEES 2008, AOUT 2010



**Description des participants**


Nb ES sollicités	Nb ES participants	%	Nb Lits	%	Nb JH	%	DDJ / 1000 JH	
2 741	<b>861</b>	31,4	191 213	42,2	58 367 637	44,3	<b>369</b> (taux global)	<b>316</b> (médiane)

**Consommation d'antibiotiques par type d'établissement et par secteur d'activité**


Type	N	Nb DDJ / 1000 JH	
		Taux global	Médiane
CHU	30	546	609
CH	243	393	380
MCO	262	420	416
CLCC	11	483	402
HIA	5	688	794
ESSR	158	187	161
LOC	71	133	138
ESLD	19	77	71
PSY	62	62	52

Secteur d'activité	N	Nb DDJ / 1000 JH	
		Taux global	Médiane
MED	316	628	570
CHIR	267	591	570
REA	132	1 427	1 465
OBS	177	352	317
PED	119	345	332
SSR	383	210	199
SLD	187	76	71
PSY	114	66	59

**Distribution des consommations d'antibiotiques par type d'établissement**




## Distribution des consommations d'antibiotiques par secteurs d'activité



## Consommation par famille d'antibiotiques


Distribution des différentes familles d'antibiotiques, tous établissements confondus (N=861)




## Consommation des différentes familles d'antibiotiques par type d'établissement

Famille d'antibiotiques	Nombre de DDJ / 1000JH (taux globaux)									
	CHU	CH	MCO	CLCC	HIA	ESSR	LOC	ESLD	PSY	Ensemble
Pénicilline A	89	69	65	37	89	30	22	15	16	62
Amoxicilline + ac. clavulanique	150	143	122	127	189	52	42	24	25	119
Pénicilline M	16	9	11	15	25	5	4	1	1	9
Céphalosporine 1 et 2ème G.	11	8	44	18	17	1	0	0	0	13
Céphalosporine 3ème G	42	29	24	54	64	9	10	6	2	26
Carbapénèmes	13	3	3	11	12	2	0	0	0	4
Autres bêta-lactamines	22	6	5	16	28	2	1	0	0	8
Sulfamides	15	6	7	9	5	8	5	4	1	7
Macrolides et apparentés	30	22	17	16	40	17	13	6	6	20
Aminosides	18	10	17	20	24	3	1	0	0	11
Fluoroquinolones	70	56	67	101	112	35	24	12	7	53
Glycopeptides	22	5	7	25	13	2	1	0	0	7
Imidazolés	18	13	18	28	30	2	2	1	1	12
Divers	30	14	15	7	41	19	9	6	4	16

## Distribution des différentes familles d'antibiotiques, par secteur d'activité clinique



## Distribution des différentes fluoroquinolones, par secteur d'activité clinique



\* \* \* \* \*

### Remerciements à tous les professionnels des établissements ayant participé à la surveillance

Rapport complet, liste des participants et diaporama de présentation des résultats sur

[http://www.invs.sante.fr/publications/2010/atb\\_raisin/index.html](http://www.invs.sante.fr/publications/2010/atb_raisin/index.html)

et sur les sites des CCLIN, accessibles à partir de <http://www.cclin-france.fr>

