

AUDIT DE PRATIQUES

EVALUATION DE LA POSE



Service (intitulé) :

Code service : | _____ |

Méthode d'évaluation : cocher la case	<input type="checkbox"/> AUTO-EVALUATION → remplir 1 fiche juste après l'acte 1 seule fiche par personnel	<input type="checkbox"/> OBSERVATION (auditeur :) → remplir 1 fiche par acte observé 3 fiches maximum par personnel
--	--	--

Statut de l'audité

Catégorie professionnelle : infirmier infirmier spécialisé médecin ou interne
 manipulateur radio sage-femme
Etudiant : oui non (penser à cocher la catégorie professionnelle ci-dessus)

POSE DE CATHETER

1.1 Patient Adulte
Enfant : Prématuré < 1 mois de 1 à 30 mois de 30 mois à 15 ans

Préparation du site d'insertion

1.2 Nettoyage de la zone d'insertion oui non

1.3 Nom du produit utilisé :
(nom en toutes lettres, en précisant le type : scrub / moussant, dermique, alcoolique,....)

1.4 Catégorie du produit (réservé au responsable de la validation de la fiche) :

1.5 Rinçage oui non

1.6 Séchage oui non

1.7 Application d'un antiseptique oui non

1.8 Utilisation de compresses stériles oui non

1.9 Nom du produit utilisé :
(nom en toutes lettres, en précisant le type : scrub / moussant, dermique, alcoolique,....)

1.10 Catégorie du produit (réservé au responsable de la validation de la fiche) :

1.11 Séchage de l'antiseptique avant insertion
 spontané avec attente du séchage complet
 spontané sans attente du séchage complet
 par tamponnement à l'aide d'une compresse

Insertion du cathéter

1.12 Utilisation d'un cathéter de sécurité oui non

1.13 Port de gants pour l'insertion du cathéter oui non

1.14 Elimination immédiate du mandrin dans un collecteur situé à proximité oui non

1.15 Pansement stérile posé (ou prévu, en cas d'échec de pose du cathéter) oui non

Hygiène des mains

1.16 Avant la préparation du site d'insertion oui non

1.17 Produit utilisé : produit hydro-alcoolique savon antiseptique savon doux

1.18 Avant l'insertion du cathéter oui non

1.19 Produit utilisé : produit hydro-alcoolique savon antiseptique savon doux

FICHE VALIDÉE : OUI (réservé au responsable de la validation)





EVALUATION DE LA POSE : AIDE AU REMPLISSAGE DE LA FICHE

(Document réservé à l'auditeur ou au relais pour les questions relatives à l'auto-évaluation)

CRITERES D'INCLUSION/D'EXCLUSION

Matériel concerné : cathéters veineux périphériques

Matériel non concerné : cathéters sous-cutanés, dispositifs épicroâniens, microperfuseurs, tout dispositif utilisé pour la perfusion sous-cutanée

Patient : Adulte ou enfant

1.2. Nettoyage* de la zone d'insertion : au bloc opératoire, la douche pré-opératoire ne remplace pas l'étape de déterSION*

1.4. Pour la catégorie du produit, préciser parmi les propositions suivantes :

Produits cités dans les recommandations (adultes ou pédiatriques) pour le nettoyage :	Autres produits observables lors de la phase de nettoyage :
<ul style="list-style-type: none"> - chlorhexidine solution moussante (savon antiseptique) - polyvidone iodée solution moussante (savon antiseptique) - savon doux - chlorhexidine faiblement alcoolisée 	<ul style="list-style-type: none"> - polyvidone iodée alcoolique - chlorhexidine alcoolique - autre produit

1.10. Pour la catégorie du produit utilisé pour l'antiseptie, préciser parmi les propositions suivantes :

- polyvidone iodée alcoolique
- chlorhexidine alcoolique
- chlorhexidine faiblement alcoolisée
- alcool à 70°
- solutés chlorés
- polyvidone iodée aqueuse
- autre produit

1.11. Séchage de l'antiseptique :

- chez les adultes et les enfants (hormis les prématurés), un séchage spontané est attendu, c'est-à-dire sans essuyage ni tamponnement à l'aide d'une compresse (à titre indicatif, environ 30 s quand l'antiseptique est alcoolique).
- chez les prématurés, l'application de l'antiseptique doit être suivie d'un rinçage à l'eau stérile et d'un séchage par tamponnement avec compresse stérile.

1.13. Port de gants : il s'agit de gants, stériles ou non, enfilés juste avant l'insertion du cathéter

1.15. Pansement stérile : il doit s'agir d'un pansement commercialisé, prêt à l'emploi.

1.18. Hygiène des mains avant l'insertion du cathéter : il s'agit de l'hygiène des mains réalisée avant de mettre les gants et de piquer.

