

PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES

- EN HOSPITALISATION OU SOINS A DOMICILE -

Signalez le portage de BMR
aux soignants qui visitent votre
enfant (infirmier, médecin,
kinésithérapeute,
aide-soignant, ...)
afin qu'ils respectent des
précautions, essentiellement
l'hygiène des mains.



- SOINS DE SUITE -

Les mesures d'hygiène de base
doivent absolument être
respectées :

hygiène des mains,
hygiène corporelle,
changement de vêtement..

L'isolement des enfants
porteurs très disséminateurs
peut être envisagé.




Si votre enfant doit être à nouveau
hospitalisé dans les mois qui suivent,
signalez qu'il a été porteur de BMR afin
qu'une recherche soit faite, si possible,
à son admission.

Si ces informations soulèvent des questions,
le personnel soignant et les professionnels de l'hygiène
de l'établissement sont prêts à y répondre.
N'hésitez pas à vous adresser à eux :

PAS DE PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

- AU DOMICILE -



Avec le temps,
ses bactéries
habituelles vont
remplacer le plus
souvent celles
acquises à l'hôpital.
Votre enfant peut

donc reprendre ses
activités scolaires et
extrascolaires, sans
précautions particu-
lières en respectant
simplement une
hygiène corporelle quotidienne.



- VIE EN COLLECTIVITE -

Crèche, centre de vacances,
...Aucune précaution particu-
lière n'est nécessaire.
Les mesures d'hygiène de base
doivent absolument être
respectées :

hygiène des mains,
hygiène corporelle,
changement de vêtement.



Coordonnées du service :

VOTRE ENFANT EST PORTEUR D'UNE BACTERIE MULTI-RÉSISTANTE AUX ANTIBIOTIQUES (BMR)



Voici quelques informations et
précautions simples d'hygiène à respecter
pour éviter sa transmission.

AUTEURS :

A. Carbonne, C. Coclez-Meyer, C. Décade, D. Farret, J.M. Germain, D.
Landriu, K. Lebascle, L. Marty, C. Mercier, M. Naas, P. Saint Laurent,
M. Vanhuffel et l'InterCLIN pédiatrique de l'AP-HP présidé par Y. Aujard




Centre inter-régional de Coordination de la Lutte
contre l'Infection Nosocomiale
Institut Biomédical des Cordeliers,
15 rue de l'école de médecine, 75006 Paris
Site Internet : <http://www.ccr.jussieu.fr/cclin>

QU'EST-CE QU'UNE BMR ?

Nous sommes tous porteurs de bactéries : sur notre peau, nos muqueuses et dans notre tube digestif. La plupart de ces bactéries sont naturellement sensibles aux antibiotiques mais elles peuvent devenir résistantes parfois sous l'influence de traitements antibiotiques. Il est alors difficile de soigner les infections causées par ces bactéries.

Exemple : le staphylocoque doré multi-résistant, *Klebsiella pneumoniae productrice de BLSE*

QUELS SONT LES MODES DE TRANSMISSION ?



COMMENT SAIT-ON QU'UN ENFANT EST PORTEUR DE BMR ?

Tout enfant hospitalisé peut être porteur.

Le portage est identifié :

- soit lors d'un dépistage au niveau du nez, de la peau, sur les plaies, ou dans le rectum.
- soit lors d'une infection.

Certaines précautions peuvent prévenir la transmission des BMR.

PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES

- EN HOSPITALISATION DE COURTE OU MOYENNE DUREE -

Un logo apposé sur la porte de sa chambre et ses dossiers permet de signaler à tous, soignants et parents, les précautions qu'ils doivent prendre lors des soins et des visites.

Apposez le logo d'isolement BMR de l'hôpital

MESURE ESSENTIELLE POUR L'ENFANT, LES PARENTS ET LES VISITEURS

Hygiène des mains

avec une solution hydro-alcoolique (ou un savon antiseptique) avant de sortir de la chambre



MESURES COMPLEMENTAIRES

POUR L'ENFANT

- ➡ Procéder à une toilette et au changement de vêtements quotidiennement
- ➡ N'utiliser que les W.C. de la chambre, puis faire une hygiène des mains
- ➡ Interdire les déplacements dans les autres chambres
- ➡ Préférer les jeux dans la chambre aux jeux collectifs

POUR LES PARENTS ET LES VISITEURS

- ➡ Ne pas être plus de 2 visiteurs dans la chambre

Selon la situation, d'autres précautions peuvent vous être demandées (ex : port de masque, de surblouse)

PENDANT COMBIEN DE TEMPS CES PRÉCAUTIONS DOIVENT - ELLES ÊTRE PRISES ?

Généralement, pendant toute la durée de l'hospitalisation si elle est courte. Si l'hospitalisation se prolonge, une réévaluation sera faite par le médecin.