

En 2002, le réseau INCISO regroupait 18 services de chirurgie urologique de l'interrégion Paris Nord. Au total, 894 patients ont été inclus. Le tableau de bord ci-dessous présente les principaux résultats de ce réseau et vous permet de positionner les résultats de votre service pour les commenter et en faire un document de synthèse que vous pourrez diffuser.

1 -Suivi des patients :

Nombre de patients suivis dans le service pendant l'étude :

/ _ / _ / _ /

Proportion de patients revus 30 jours après l'intervention : 0% 58% 100%

Proportion de patients revus après la sortie du service : 0% 80% 100%

Proportion de chirurgie ambulatoire : 0% 8% 100%

Le taux d'ISO est fonction du nombre de patients revus à J30. L'ensemble des indicateurs présentés est sous estimé si la proportion de patients revus à J30 est faible.

Répartition des patients selon le délai entre l'intervention et la consultation

| Délai entre l'intervention et la consultation (jours) | Réseau INCISO | | Service : | | Différence de suivi des patients dans le service et dans le réseau INCISO (%) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | Nombre de patients revus | Pourcentage du total (%) | Nombre de patients revus | Pourcentage du total (%) | |
| [0 to 5[| 120 | 13,4 | | | |
| [5 to 10[| 46 | 5,1 | | | |
| [10 to 15[| 45 | 5,0 | | | |
| [15 to 20[| 44 | 4,9 | | | |
| [20 to 25[| 57 | 6,4 | | | |
| [25 to 30[| 64 | 7,2 | | | |
| 30 et plus | 518 | 57,9 | | | |

2 - Répartition des services selon le taux d'incidence des ISO pour 100 opérés de NNIS égal à zéro

Le NNIS est un index de gravité qui permet de classer les patients en catégories de risque croissant. Le graphique ci-dessous présente la répartition des taux d'ISO pour les patients de NNIS égal à zéro, parmi les 2 services ayant inclus au moins 100 patients. Au total, 59% des patients opérés sont à faible risque d'ISO (NNIS=0).


Un service avaient un taux d'ISO compris entre 0% et 1% pour les patients NNIS zéro. Le deuxième avait un taux compris entre 6% et 7% pour ces patients.

3 - Interventions les plus fréquentes et taux d'ISO parmi les 894 patients opérés :

| | Proportion du total des interventions | Taux d'ISO |
|---|---------------------------------------|------------|
| Néphrectomie | 4,2% | 7,9% |
| Chirurgie de l'appareil urinaire | 33,6% | 3,7% |
| Prostatectomie endourétrale | 12,7% | 1,7% |
| Intervention sur la prostate sauf prostatectomie endourétrale | 8,3% | 6,7% |
| Intervention sur les organes génitaux masculins | 14,6% | 3,0% |

4 - Autres facteurs permettant de commenter les taux d'ISO :

- Proportion d'interventions réalisées en urgence : 0% **8%** 100%
- Proportion de chirurgie endoscopique : 0% **↑ 53%** 100%
- Site de l'infection : **↑**



5 - Commentaires et synthèse du référent INCISO concernant les résultats du service :