

PORT DE GANTS



Lorsqu'il y a risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques (selles, urines, crachats..), des plaies, des muqueuses, du matériel souillé et systématiquement en cas de lésions cutanées, le port de gant est essentiel.

**1 paire de gants
= 1 soin**



Avant et après le port des gants :
l'hygiène des mains est
INDISPENSABLE.



Un contact avec la
peau saine d'un patient
ne nécessite pas de
porter des gants.

LES PRECAUTIONS « STANDARD »

	Hygiène des mains Avant	Port de gants	Port de Masque	Port de lunettes	Port de tenue de protection	Hygiène des mains Après
Soins Peau Saine (Prise de tension, prévention escarre, examen clinique...)						
Prélèvement sanguin						
Soins Mouillant (Toilette...) ou Souillant (Change...)						
Soins avec risque de projections liquide biologique (prélèvement respiratoire...)						

Les précautions « standard » c'est aussi:

- suivre les recommandations de prévention et d'utilisation du matériel de sécurité pour éviter les Accidents d'Exposition au Sang (AES)
- connaître la conduite à tenir en cas d'AES
- respecter la maintenance des dispositifs médicaux, les locaux, les surfaces et les filières : déchets et linge souillé

Tous les jours

Pour tous les patients

Par tous les soignants



Appliquons
les précautions
"standard" !



Coordonnées de l'Equipe Opérationnelle d'Hygiène

CLIN Paris-Nord Antenne Régionale Nord Pas de Calais

Rédaction : Yann Ollivier, Ghislaine Lemaire, Karine Blanckaert
Relecture : Danièle Landriu, Michèle Aggoune, Denis Thillard,
Annie Brenet, Zoher Kadi, Karin Lebascle, Anne Carbonne

CONTEXTE

Les Précautions « Standard » servent à éviter la transmission croisée de micro-organismes

- ✓ De soignant à patient
- ✓ De patient à soignant
- ✓ De patient à patient



Elles sont à appliquer à **tout patient quel que soit son statut infectieux.**

Elles consistent en la mise en place de mesures « barrière » :

- Hygiène des mains
- Gants
- Tablier plastique
- Masque
- Lunettes
- Gestion du risque AES

Références :

- Circulaire DGS/DH N°98/249 du 20 avril 1998
- 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales - CTIN - 1999
- Prévention de la transmission croisée : Précautions complémentaires contact- Consensus formalisé d'experts - SFHH - Avril 2009

HYGIENE DES MAINS




Avec un Produit
Hydro Alcoolique



C'est plus simple et plus efficace !

Quand réaliser une hygiène des mains ?



Source OMS

Quelques consignes pour bien faire :

- Mains et avant bras **sans bijoux, ni alliance**
- Friction jusqu'au séchage complet du produit

L'utilisation de savon antiseptique pour l'hygiène des mains n'est pas recommandée.

TENUE DE PROTECTION



Port d'une tenue de protection lors des **soins mouillants ou souillants** et si il y a un risque de projection de liquide biologique



sans manche



Manches longues

Exemple de soins mouillants ou souillants :

- Toilette
- Change
- Pose sonde urinaire
- Soins aux patients ayant des diarrhées

Jeter la tenue de protection à usage unique à la fin de la séquence de soins ou avant de passer à un autre patient.

MASQUE / LUNETTES



Port de masque et lunettes :



Lors des actes à risques de projections de sang et/ou liquide biologique (ex : aspiration, endoscopie,...)

1 masque = 1 patient ou 1 soin